

Ficha Técnica

Nombre del producto	IBUPROFENO SUSPENSIÓN ORAL 200 mg/ 5mL.		
Registro ISP	F-24851	Condición de venta	Directa en Establecimiento Tipo A y B.
Forma Farmacéutica	SUSPENSION ORAL	Código ATC	M01AE01
Presentación	Caja unidad	Vía de administración	Oral
Descripción de envase	Caja de cartón, impresa y/o etiquetada, debidamente sellada y rotulada, que contiene frasco de PEAD blanco, con tapa blanca del tipo pilfer de PEAD, con un vaso dosificador de polipropileno (PP), de 1 a 100 mL de suspensión Oral.	Condiciones de almacenamiento	No mayor a 25° C, Protegido de la luz
		Periodo de eficacia	24 meses

- **COMPOSICIÓN:**
 - Cada 5 ml de suspensión oral contiene Ibuprofeno 200 mg
 - Excipientes: Sucralosa, benzoato de sodio, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico celulosa microcristalina/carboximetilcelulosa sódica, goma xantán, ácido cítrico anhidro, polisorbato 80, esencia cherry sweet, glicerol, sorbitol, colorante FD&C rojo N°40, agua purificada.
- **CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:** Antipirético, analgésico y antiinflamatorio no esteroidal.
- **INDICACIONES:** Indicado para el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y musculo-esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.
- **Vía de Administración:** Oral.
- **DOSIS:**
 - El médico o dentista debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante, la dosis usual inicial recomendada es



Laboratorio Farmacéutico

- **PARA ADULTOS: 200 mg cada 4 a 6 horas, con un máximo de 1200 mg diarios.** En niños mayores de 6 meses: 5-10mg por kilo de peso cada 8 horas, con un máximo diario de 40mg por kilo de peso al día.
- Consejo de cómo administrarlo: Puede tomarlo en conjunto con alimentos, leche o antiácidos para mejorar la tolerancia del medicamento

- **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**
 - **Mayores de 60 años:** Los problemas estomacales pueden ser severos en pacientes mayores de 60 años.
 - **Consumo de alcohol:** Si se ingiere junto al medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y hemorragias.
 - **Manejo de vehículos:** Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria o realizar cualquier otra actividad potencialmente riesgosa.
 - **Embarazo:** Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada. No se recomienda su uso en los tres meses de embarazo.
 - **Lactancia:** Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.
 - **Lactantes y niños:** Puede utilizarlo sólo si está indicado por su pediatra y bajo circunstancias específicas.
 - **Precauciones especiales:** Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.
 - Usted debe consultar a su médico antes de usar Aines (con excepción de ácido acetil salicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca)
 - Debe comunicar a su médico si ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.
 - **Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**
 - Si tienen úlcera gastrointestinal
 - Si ha presentado síntomas de alergia al Ibuprofeno o a medicamentos similares como el ácido acetil salicílico (aspirina).
 - Estando embarazada o durante el periodo de lactancia.
 - Si ha presentado alergia a este medicamento o a algún excipiente de la formulación.



Laboratorio Farmacéutico

- **INTERACCIONES:**

- **MEDICAMENTOS:** Usted debe consultar la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otros, particularmente medicamentos para la presión, Prednisolona, Warfarina, antibióticos en general, Itraconazol o Ketoconazol, Penicilamina, Acido Valproico, Fenitoína, Ciclosporina, Digoxina, o Digitoxina, Litio, Metotretato, Probenecid, Triamtireno o Zidovudina (AZT). No se debe tomar en forma conjunta con otros medicamentos como ácido acetilsalicílico (aspirina) (o similares) a menos que su médico lo determine.
- **Enfermedades:** Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular, o cualquier enfermedad crónica severa.
- En el caso particular de este medicamento, si padece de hemorragias, inflamación o úlceras gastroduodenales, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales, o historia de enfermedades al corazón o consumo crónico de alcohol, enfermedades renales o al hígado.

- **EFFECTOS ADVERSOS:**

- Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las piernas, dolor en el pecho, úlcera péptica con vómitos con sangre, melena, disminución de la frecuencia para orinar o de la cantidad de orina.
- **Otros efectos:** Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifican: náuseas, diarrea leve, constipación leve, dolor de cabeza leve, vértigo, somnolencia, úlceras o dolor en la boca, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies, visión azulrojiza.

- **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- No Dejar al alcance de los niños.
Manténgase en su envase original
Almacenar a no más de 30° C, protegido de la luz.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.